Formatif 3

Question 1

Vrai ou faux ?

- a) Si A est une matrice $n \times n$ avec $n > 1$, alors pour tout nombre réel k

$$|kA| = k|A|.$$

- b) Toute matrice peut s'écrire comme un produit de matrice élémentaires.

- c) Si $|A|^2 = 1$, alors $A = I$.

d)
$$\begin{pmatrix} 3k & 2k & k \\ k & -k & k \\ 3k & 2k & k \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- e) La matrice zéro 0 est une matrice orthogonale.

- f) Pour toute fonction linéaire $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ si on connaît l'effet de T sur deux vecteurs différents, alors on peut déterminer la valeur de $T(x,y)$ pour tout vecteur (x,y) .

- g) $R_{\pi/7}^{14} = I$.

- h) À toute transformation $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ du plan dans le plan correspond une matrice A telle que

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

- i) Si une transformation $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est linéaire, alors $\det([T]) \neq 0$

Question 2

Laquelle des affirmations suivantes n'est pas équivalente aux autres :

- (1) $\det(A) \neq 0$.
- (2) Les colonnes de A ne forment pas une base.
- (3) Le système d'équation ayant comme forme matricielle $AX = C$ a une solution unique.
- (4) $A \sim I$
- (5) Le rang de A est n .

Question 3

Soient A , B et C les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Isoler X dans les équations suivantes et déterminer sa valeur.

a) $AXB = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

b) $A^T X = BC^T$

c) $BX = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Question 4

Soit A , B et C des matrices 3×3 telles que $\det(A) = 2$, $\det(B) = -1$ et $\det(C) = 3$. Calculer le déterminant suivant à l'aide des propriétés des déterminants.

$$\left| A^{-1}((2B)^2 C^T)^{-1} \right|$$

Question 5

Écrire la matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

comme un produit de matrices élémentaires et d'une matrice ERL.

Question 6

Calculer l'inverse de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) avec la méthode de réduction de Gauss-Jordan
- b) en utilisant la matrice adjointe

Question 7

Calculer le déterminant de la matrice suivante.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Question 8

Soit le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f. \end{cases}$$

- a) Donner une condition sur la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

qui permet de savoir quand le système d'équations a une solution unique.

- b) En supposant que le système a une solution unique, écrire le système d'équations sous forme d'une équation matricielle et résoudre cette équation matricielle pour obtenir une formule donnant x et y en fonction des paramètres a , b , c , d , e et f .

Question 9

Soit $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la fonction définie par

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y+1 \\ y^2 \end{pmatrix}.$$

- a) Évaluer $T \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $T \begin{pmatrix} x+1 \\ x \end{pmatrix}$.
- b) Montrer que la fonction T n'est pas linéaire.
- c) Le graphique suivant présente l'effet de T sur le carré unité. Donner une raison géométrique pour laquelle la transformation ne peut pas être linéaire.

Question 10

Trouver une matrice carrée 2×2 telle que $A \neq I$ et $A^3 = I$.

Question 11

Déterminer la matrice associée aux applications linéaires suivantes.

- a) l'application linéaire définie par $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}$.
- b) La transformation linéaire T définie par $T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- c) La transformation linéaire T^{-1} inverse de celle donnée en b
- d) Une homothétie de facteur 2 suivie d'une rotation d'angle $\pi/4$.
- e) La transformation qui envoie la figure de gauche sur la figure de droite

Solutions

Question 1

- a) Faux, car on peut sortir une constante k pour chaque ligne de A devant le déterminant. Comme on sort n fois une constante k du déterminant, l'égalité devrait plutôt être

$$|kA| = k^n |A|.$$

- b) Faux, seulement les matrices équivalentes lignes à la matrice identité
 c) Faux, par exemple si $A = R_\theta$, alors $|A|^2 = 1$ mais $A \neq I$
 d) Vrai
 e) Faux, car $00^T = 0 \neq I$
 f) Faux, il faut que les deux vecteurs forment une base
 g) Vrai : $R_{\pi/7}^{14} = R_{14 \cdot \frac{\pi}{7}} = R_{2\pi} = I$
 h) Faux, l'affirmation est vraie seulement si T est linéaire.
 i) Faux car le déterminant de certaines applications linéaires peut être 0, par exemple si T est l'application 0.

Question 2

(2)

Question 3

- a) $X = A^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} B^{-1} = C - \frac{1}{56} \begin{pmatrix} -18 & -6 \\ -19 & 3 \end{pmatrix}$
 b) $X = (A^{-1})^T BC^T = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 28 & -7 \\ 4 & -11 \end{pmatrix}$
 c) $X = B^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Question 4

déterminant = $\frac{1}{384}$

Question 5

Il y a plusieurs réponses possibles, selon l'ordre des opérations dans la réduction. Si on réduit A à sa forme ERL R , on fait deux opérations élémentaires ayant comme matrices élémentaires associées E_1, E_2 . On a donc que $E_2 E_1 A = R$, ce qui implique que $A = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} R$, ce qui est un produit de matrices élémentaires (l'inverse d'une matrice élémentaire est élémentaire) et d'une matrice ERL.

Une possibilité est

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Question 6

- a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$
 b) Avec la matrice adjointe, on utilise la relation $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$. L'adjointe est

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

et le déterminant est $\det(A) = 1$.

Question 7

Pour simplifier les calculs, on peut soustraire la deuxième colonne à la première et développer selon la première colonne.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\ = -2 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ = (-2)(-4) = 8$$

Question 8

- a) $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$, ou « les lignes de A sont linéairement indépendantes », ou encore « la matrice A est inversible. »

Toutes ces conditions sont équivalentes.

- b) Si on pose $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$, le système d'équations s'écrit $AX = B$. Il a pour solution unique $X = A^{-1}B$. Comme $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, on a que

$$X = A^{-1}B \\ = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix} \\ = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} de-bf \\ -ce+af \end{pmatrix}$$

ce qui nous donne

$$x = \frac{de-bf}{ad-bc}, \quad y = \frac{-ce+af}{ad-bc}.$$

Question 9

- a) $T \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 1^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 1^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $T \begin{pmatrix} x+1 \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x+1)+x+1 \\ x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+2 \\ x^2 \end{pmatrix}$

- b) D'une part, on a que

$$T \begin{pmatrix} kx \\ y \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx+ky+1 \\ (ky)^2 \end{pmatrix}$$

D'autre part,

$$kT \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x+y+1 \\ y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx+ky+k \\ ky^2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$T \begin{pmatrix} kx \\ y \end{pmatrix} \neq kT \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

et donc T ne peut être linéaire.

- c) L'origine n'est pas envoyée sur l'origine et les droites ne sont pas envoyées sur des droites.

Question 10

La matrice de rotation $R_{2\pi/3} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Il est clair que $R_{2\pi/3} \neq I$ et on a que $R_{2\pi/3}^3 = R_{3 \cdot 2\pi/3} = R_{2\pi} = I$.

Question 11

- a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
 b) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
 c) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
 d) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$
 e) $[T] \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et donc

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \\ = -\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ = -\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$